

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

1157

Tamaño: Grande.

Forma: Muy variable: turbinada, piriforme truncada, doliforme u oblonga. En disminución hacia el pedúnculo, con cuello muy ligero o sin llegar a formar cuello. Asimétrica. Superficie muy irregular abullonada. Contorno muy irregular.

Cavidad del pedúnculo: Muy superficial o casi nula, irregular, mamelonada. **Pedúnculo:** Mediano. Grosor variable, fuerte y leñoso o semi-carnoso y muy engrosado en la base. Extremo superior formando maza. Recto o curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo.

Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Borde irregular y fuertemente ondulado. **Ojo:** Pequeño o mediano. Entreabierto o cerrado. Sépalos carnosos, amarillentos, erectos o convergentes ligeramente separados en la base.

Piel: Lisa o semi-ruda, brillante o mate. **Color:** Verde o verde amarillento sin chapa o con ligera zona bronceada. Punteado muy abundante, ruginoso, fino, sin aureola. Pequeñas zonas ruginosas de tono oliváceo en la base del pedúnculo y diseminadas en pequeñas manchitas o ligera maraña por el resto del fruto; otra zona más compacta, a veces formando círculos, alrededor del ojo.

Tubo del cáliz: En embudo con conducto de longitud media, estrecho en la entrada y ensanchándose ligeramente hacia el corazón.

Corazón: Pequeño, redondeado, muy próximo al ojo. Eje lanceolado relleno o ligeramente hueco en su parte más ancha. Celdillas redondeadas de tamaño justo para contener las semillas.

Semillas: Grandes. Elíptico-redondeadas, aplastadas. Punto de inserción muy redondo y ladeado. Color castaño oscuro con rebordes casi negros.

Carne: Blanca, amarillenta bajo la piel. Semi-granulosa, jugosa. **Sabor:** Ligeramente acidulado, algo alimonado. Soso.

Maduración: Otoño.

